

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΑΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ;

Η καθημερινή κοινωνική συμπεριφορά των εφήβων και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες βοηθούν στη διασπορά των μικροβίων.



ΣΤΕΝΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΑΦΕΣ/ΦΙΛΙ




ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ



ΚΑΠΝΙΣΜΑ



ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΑ
ΜΕΡΗ



ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΑΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ

Βεβαιωθείτε ως γονείς ότι το παιδί σας
έχει εμβολιαστεί ενάντια στη Μηνιγγιτιδοκοκκική Νόσο

Σύμφωνα με μελέτες,
οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες καθυστερούν
να ζητήσουν ιατρική βοήθεια, καθυστερώντας
έτσι την ιατρική περίθαλψη και αυξάνοντας
τον κίνδυνο μακροπρόθεσμων επιπτώσεων.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία
είναι ζωτικής σημασίας.



Βεβαιωθείτε ως γονείς ότι το παιδί σας
έχει εμβολιαστεί ενάντια στη
Μηνιγγιτιδοκοκκική Νόσο.

Μιλήστε με τον γιατρό σας σήμερα!

Η μέση επίπτωση της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία (2014-2018) ήταν 0,5 κρούσματα/100.000 πληθυσμού, ενώ για την ίδια περίοδο η μέση τιμή των θανάτων από τη νόσο κατά έτος ήταν 3,6. (Ετήσιες εκθέσεις Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, 2014-2018, διαθέσιμες στο: http://www.nsph.gr/default.aspx?page=tdy_minigitida). Ο εμβολιασμός ενάντια στη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο τύπου C περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και χορηγείται δωρεάν σε όλα τα νήπια από την ηλικία των 12 μηνών. Ο εμβολιασμός ενάντια στη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο τύπων A,C, W και Y περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και χορηγείται δωρεάν σε όλους του εφήβους από την ηλικία των 11 ετών. Ο εμβολιασμός ενάντια στη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο τύπου B περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και χορηγείται δωρεάν για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000

Pfizer Ελλάς Cyprus Branch, Λ. Αθαλάσσης 26, 2ος όροφος Κτήριο Στεφανή,
Λευκωσία 2018, Κύπρος, Τηλ. Επικοινωνίας: +357-22817690



Δεν υπάρχει εμβόλιο για αυτό...



ΝΕΟΙ
ΣΕ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ

Όμως, υπάρχει εμβόλιο
κατά της Μηνιγγιτιδοκοκκικής Νόσου!

Μερικές από τις καθημερινές συμπεριφορές των εφήβων, όπως το φιλή, ο συνωστισμός, οι ομαδικές συνθήκες διαβίωσης και το να μοιράζονται το φαγητό ή το ποτό τους, μπορεί να τους εκθέσουν στο βακτήριο του μηνιγγιτιδοκοκκου.

Ενημερωθείτε από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για τον εμβολιασμό εφήβων και νεαρών ενηλίκων ενάντια στη Μηνιγγιτιδοκοκκική Νόσο.

Μάθετε περισσότερα στο www.emvoliazo.gr/teens



ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΑΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΝΟΣΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΝΟΣΟ

Μετά τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες εμφανίζουν αυξημένη επίπτωση της νόσου, ενώ αποτελούν και τους κύριους φορείς του μηνιγγιτιδόκοκκου.

Τι είναι η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος;

- Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο *Neisseria meningitidis* (Μηνιγγιτιδόκοκκος) και αποτελεί την κύρια αιτία βακτηριακής μηνιγγίτιδας και σηψαιμίας σε πολλά μέρη του κόσμου
- Ο μηνιγγιτιδόκοκκος διασπείρεται από άτομο σε άτομο μέσω των εκκρίσεων του ανώτερου αναπνευστικού
- Τα συμπτώματα αρχίζουν ήπια και είναι παρόμοια με αυτά ενός κρυολογήματος ή μιας γρίπης - με πυρετό, κεφαλαλγία και πόνο στους μυς και τις αρθρώσεις
- Αν και δεν πρόκειται για μία κοινή ασθένεια, η Μηνιγγιτιδοκοκκική Νόσος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο μέσα σε 24 ώρες
- Πιθανές μακροχρόνιες επιπλοκές της νόσου:



Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΝΟΣΟ

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια για τις πιο συχνές οροομάδες:



Δεν υπάρχει κάποιο
μοναδικό εμβόλιο που να καλύπτει και
τις 5 πιο συχνές οροομάδες

Περίπου **1 στα 3** κρούσματα Μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου οροομάδας B στην Ελλάδα κατά τα έτη 2011-2015 ήταν σε ηλικίες 10-24 ετών



Μέχρι 1 στις 10 περιπτώσεις
διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής
νόσου είναι θανατηφόρες,
τυπικά μέσα σε 24-48 ώρες


Οι έφηβοι και νεαροί
ενήλικες βρίσκονται
σε αυξημένο κίνδυνο
να νοσήσουν από
Μηνιγγιτιδοκοκκική
νόσο οροομάδας B

Μάθετε περισσότερα στο www.emvoliazo.gr/teens

ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ, ΩΣΤΟΣΟ Η ΝΟΣΟΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Αν έχετε υποψία ότι το παιδί σας εμφανίζει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Πιθανά αρχικά συμπτώματα - Μη τυπικά:



ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ



ΠΥΡΕΤΟΣ



ΕΜΕΤΟΣ




ΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΝΑΠΝΟΗ



ΚΡΥΑ ΑΚΡΑ



ΩΧΡΟΤΗΤΑ



ΔΙΨΑ



ΜΥΙΚΟΣ
ΠΟΝΟΣ

Τυπικά συμπτώματα:



ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ



ΑΥΧΕΝΙΚΗ
ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ



ΦΩΤΟΦΟΒΙΑ



ΣΥΓΧΥΣΗ